



O USO DE PASTA ENTÉRICA HOMEOPÁTICA EM BEZERROS

¹Maysa Regina Queiroz Topa, ²FABRICIO FRANCISCO RIBEIRO DE SOUZA, ³MATHEUS MACHADO TEIXEIRA, ⁴THIAGO AMORIM VANETI, ⁵VINICIUS YUJI FUJIOKA, ⁶RANULFO PIAU JUNIOR

¹Acadêmica do curso de medicina veterinária- PIC/UNIPAR

²Acadêmico do curso de medicina veterinária PIC/UNIPAR

³Zootecnista

⁴Acadêmico de medicina veterinária unipar PIC/UNIPAR

⁵Acadêmico do Curso de Medicina Veterinária PIC/UNIPAR

⁶Docente da UNIPAR

Introdução: A diarreia em bezerros é considerada uma ameaça na pecuária, impondo impactos econômicos significativos tanto a pequenos quanto a grandes produtores. Esta enfermidade, que, por muitas vezes não é levada a sério, desencadeia grandes desafios que refletem por todo o setor, afetando a saúde dos animais e a estabilidade financeira dos criadores. A diarreia é caracterizada por uma grande perda de líquidos e eletrólitos corporais que acaba levando o animal a desidratação e

consequentemente a um quadro de choque hipovolêmico devido a essas perdas (Ristow, 2022). Diversos são os fatores responsáveis pelo desencadeamento do processo de diarreia como: agentes enteropatogênicos; bactérias (*Escherichia coli*, *Salmonella sp.*, *Clostridium perfringens*); vírus (*rotavírus* e *coronavírus*); protozoários (*Eimeria sp.*); verminoses; além de fatores nutricionais, como a ingestão excessiva de leite ou rações similares e fatores relacionados ao meio ambiente (Maba, 2022). A

homeopatia pode ser uma alternativa aos antibióticos no controle da diarreia em bovinos. O objetivo foi relatar um caso de uso de medicamento homeopático no combate a diarreia em bezerros.

Relato de caso: Em um lote de quatro bezerras com a idade de 40 dias, da raça holandesa, provenientes de uma propriedade no município de Tamana, Paraná, com bom escore corporal, apresentaram um surto de diarreia com cor clara amarelada e aquosa. Após o diagnóstico de diarreia foi iniciado o tratamento utilizando uma pasta entérica diarreia, com a aplicação de uma bisnaga de pasta entérica por dia, cuja formulação possuía os seguintes medicamentos homeopáticos: *Arsenicum album CH9* e *CH12*, *Carbo vegetabilis CH200*, *Colibacillinum CH9*, *Cuprum metallicum CH9*, *Enterococcinum CH9*, *Mercurius solubilis CH9*, *Natrum muriaticum CH6*, *Sulphur CH9*, *Veratrum album CH6*. Tempo de administração da pasta entérica foi de cinco dias, no quarto dia de aplicação os animais apresentaram fezes normais.

Discussão: O tratamento com núcleo homeopático foi eficaz no tratamento da diarreia em bezerros. Corroborando com presente caso, Camerlink *et al.* (2010) em um estudo com 525 leitões observou uma eficácia no tratamento de diarreia em leitões utilizando um medicamento homeopático a base de *Colibacillinum*, medicamento que faz parte do núcleo homeopático diarreia. Outros estudos têm constatado bons resultados quanto à aplicação da homeopatia. Fortuoso *et al.* (2018) avaliou a

administração profilática do produto homeopático no controle da diarreia neonatal bovina. Foram acompanhados 20 bezerros, divididos em grupo tratado e grupo controle. A diarreia foi diagnosticada em cinco animais tratados e em todos os do grupo controle, sendo *Escherichia coli* e *Giardia duodenalis* os principais agentes identificados. Ao final do tratamento, observou-se que o produto homeopático teve eficácia de 50% no controle da diarreia neonatal e contribuiu para a redução do uso de antibióticos, além de sugerir melhora na saúde intestinal dos bezerros. Coelho *et al.* (2009); Kiefer *et al.* (2012), demonstraram que o tratamento homeopático foi mais eficiente que o tratamento com antibióticos no controle da diarreia em leitões recém-nascidos, e concluíram que a homeopatia é uma alternativa efetiva no tratamento da diarreia em animais.

Conclusão: O uso da pasta entérica homeopática foi eficaz no tratamento de diarreias de bezerros.

Referências

MABA, M. D. **Relato de Caso-Principais agentes infecciosos causadores de diarreia em bezerras**. Trabalho de conclusão de curso, Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Curitiba, Medicina Veterinária. 2022.

FURTUOSO, B. F. *et al.* Homeopathic treatment as an alternative prophylactic to minimize bacterial infection and prevent neonatal diarrhea in calves. **Microbial Pathogenesis**. v.114, p.95-98, Novembro, 2017.

RISTOW, L. E. **Diarreia em bezerros: o diagnóstico laboratorial Como aliado**. Disponível em: <https://www.tecsa.com.br/assets/uploads/eventos/03971cfbe64cf2261cc88428d5422fda.pdf>. Acesso em: 06 jul. 2025.

CAMERLINK, I. *et al.* Homeopathy as replacement to antibiotics in the case of *Escherichia coli* diarrhoea in neonatal piglets. **Homeopathy**, v.9, p.57-62, 2010.

COELHO, C. P. *et al.* Evaluation of preventive homeopathic treatment against Colibacillosis in swine production.

International Journal of High Dilution Research, v.8, p.183-190, 2009.

KIEFER, C. et al. Complexo homeopático na prevenção e tratamento de diarreias em leitões lactentes. **Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal**, v.13, n.1, p.74-82, 2012.

